

Directrices de alimentación posoperatoria luego de la reparación labial para bebés con labio hendido únicamente

¿Cómo debo alimentar a mi bebé después de la cirugía?

Su bebé puede retomar de inmediato el método de alimentación que usted utilizaba antes de la reparación, incluyendo el uso de tetina y biberón regulares o lactancia materna.

¿Cómo impactará la cirugía cuando le dé alimentos hechos puré/inicie con alimentos sólidos?

Se recomienda introducir purés alrededor de los 6 meses de edad. Si su bebé ya había empezado a comer purés antes de la reparación labial, él (ella) puede retomar de inmediato los purés con cuchara. Si su bebé no había empezado a comer purés antes de la reparación, se recomienda esperar para introducirlos hasta que tenga una edad apropiada, usualmente a los 6 meses.

¿Puede mi bebé usar el chupón después de la cirugía?

No debería usar chupón por 14 días (2 semanas) después de la cirugía. Es mejor eliminarle el chupón al bebé antes de la cirugía. Puede intentar abriéndole un agujero al fondo del chupón por unos días y luego poco a poco ir cortándolo cada dos días hasta que el bebé ya no pueda chuparlo y se interese menos en él.

¿Qué sucede si mi bebé no come después de la cirugía?

Primero, dele un poco de tiempo. A veces puede ser difícil salir de la anestesia. Empiece ofreciéndole el mismo biberón que utilizaba antes de la cirugía o retome la lactancia materna. Si su bebé sigue teniendo dificultades, intente poniéndole al biberón que trajo una tetina más grande (flujo más rápido). Si su bebé sigue teniendo dificultades, pida una cita con un patólogo del habla y lenguaje.

¿Tengo que volver a consulta después de la cirugía para la terapia de alimentación?

Su bebé debería ir a consulta nuevamente a Barrow Cleft and Craniofacial Center una semana después de la cirugía y luego un mes después de la cirugía.

Resumen para después de la cirugía:

	Líquidos	Purés	Chupón
Posreparación de labio	Retome de inmediato el régimen preoperatorio de pecho o tetina/biberón regular	Retome de inmediato los purés con cuchara según la edad	No utilice el chupón por 14 días

Barrow Cleft and Craniofacial Center



Por favor comuníquese con nosotros si tiene preguntas o inquietudes.

Jessica Williams, MS, CCC-SLP
Patóloga del habla y lenguaje
Jessica.Williams4@dignityhealth.org
602-406-8514

Kelly Nett Cordero, PhD, CCC-SLP
Patóloga bilingüe del habla y lenguaje
Kelly.Cordero@dignityhealth.org
602-406-5734